稲の種子消毒薬剤一覧表 令和6年1月31日現在 苗 立 寸 ネシ 枯 枯 枯 病 枯 病 病 苗 病 ば ガ ま 褐 \mathbb{L} 枯 IJ 4 カゝ 枯 使用方法名称 農薬種類名 回数 使用時期 希釈倍数•使用量 ピ 農薬名 レ 葉 条 IJ ザ 細 細 苗 枯 セ 病 \neg 病 菌 菌 病 デ ゥ 病 プ 病 チ 11/ ュウ 菌 菌 菌 菌 醸造酢液剤 1回 催芽時 24時間種子浸漬 エコフィット 100~200倍 100倍 24時間種子浸漬 0 催芽前 100~200倍 24時間種子浸漬 トリコデルマ ア 催芽時 24時間種子浸漬 エコホープDI 200倍 0 0 0 0 0 0 トロビリデ水和剤 浸種前 24~48時間種子浸漬 200倍 0 催芽前 スミチオン乳剤 MEP乳剤 1回 は種前 1000倍 6~72時間浸漬 0 100倍 専用の種子消毒機を 用いて乾燥種籾重量 の3%の量の希釈液を 種籾に吹付け処理又 は塗沫処理 タフブロック タラロマイセス 催芽時 24時間種子浸漬 200倍 0 0 0 0 0 フラバス水和剤 催芽前 200倍 24~48時間種子浸漬 0 浸種前 20倍 1時間種子浸漬 \bigcirc 0 種子重量の2~4% 湿粉衣 0 0 0 0 種子重量の4% 湿粉衣 0 浸種前~ 20倍 1時間種子浸漬 0 催芽前 テクリードCフロア イプコナゾール・ 1回 浸種前 200倍 24時間種子浸漬 0 0 0 0 0 0 0 銅水和剤 10分間種子浸漬 20倍 0 0 0 0 0 0 0 4倍(使用量は乾燥種 種子吹き付け処理 籾1kgあたり希釈液20 (種子消毒機使用)又 0 0 0 0 0 0 0 ミリリットル) は種子塗沫処理 7.5倍(使用量は乾燥 種子吹き付け処理 種籾1kgあたり希釈液 (種子消毒機使用)又 0 30ミリリットル) は種子塗沫処理 原液(使用量は乾燥 種子塗沫処理 種籾1kgあたり原液5 0 0 0 0 \bigcirc トリフミン水和剤 トリフルミゾール 1回 浸種前 300倍 24~48時間種子浸漬 0 水和剤 30倍 10分間種子浸漬 0 7.5~15倍(乾燥種籾 種子吹き付け処理 1kgあたり30ミリリット (種子消毒機使用) 0 0 乾燥籾重量の0.5% 種子粉衣(湿粉衣) 0 0 パダンSG水溶剤 1回 浸種前 1500~3000倍 24時間種もみ浸漬 カルタップ水溶

稲の種子消毒薬剤一覧表 令和6年1月31日現在 苗 立 立. 立 ネシ 枯 枯 枯 病 枯 病 病 苗 病 ば ガ ま 褐 \mathbb{F} 枯 枯 フ IJ b カゝ 使用方法名称 農薬名 農薬種類名 回数 使用時期 希釈倍数•使用量 ۲° レ 葉 条 IJ 細 ザ 苗 細 セ 枯 病 コ 病 病 菌 菌 ij 病 デ ゥ プ 病 病 チ ル ٨ Ĺ ス ュウ 菌 菌 菌 菌 ベンレートT水和 剤20 チウラム・ベノミ ル水和剤 1回 浸種前 200倍 24~48時間種子浸漬 0 0 0 0 6~24時間種子浸漬 0 0 20倍 10分間種子浸漬 0 0 0 0 0 0 0 3.75倍(乾燥種籾1kg 種子吹き付け処理 あたり希釈液30ミリリッ (種子消毒機使用)又 0 トル) は塗沫処理 24~48時間種子浸漬 400倍 0 0 7.5倍(乾燥種籾1kg あたり希釈液30ミリリッ 種子吹き付け処理 (種子消毒機使用)又 0 0 0 トル) は塗沫処理 乾燥種籾重量の0.5 種子粉衣(湿粉衣) 0 0 0 0 0 0 0 0 \circ ~1% 乾燥種籾重量の1% 種子粉衣(湿粉衣) 銅・フルジオキン ニル・ペフラゾ モミガードC・DF 1回 浸種前 24時間種子浸漬 200倍 0 0 0 0 0 0 0 エート水和剤 7.5倍(使用量は乾燥 吹き付け処理(種子種籾1kgあたり希釈液 消毒機使用)又は塗 0 \bigcirc 0 \bigcirc 0 \bigcirc 30ミリリットル) 銅・フルジオキン ニル・ペフラゾ 24時間種子浸漬 モミガードC水和 1回 浸種前 200倍 0 0 0 0 0 0 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 剤 エート水和剤 7.5倍(使用量は乾燥 吹き付け処理(種子 種籾1kgあたり希釈液 消毒機使用)又は塗 0 0 0 0 0 0 0 0 \bigcirc 30ミリリットル) 乾燥種籾重量の0.5% 種子粉衣(湿粉衣)

0

0 0 0 0 0