静岡県病害虫防除基準に採用している農薬のうち、無人航空機で使用できる薬剤一覧

令和７年３月現在

本県の主要農作物のうち、無人航空機による防除が実施、または実施見込みの作目について、防除基準掲載剤をまとめた。
無人航空機で使用できる水稲の除草剤及び植物成長調整剤は、それぞれの項目を参照する。
各薬剤の詳細は、ホームページ「産業用無人航空機用農薬」（URL：https://mujin-heri.jp/index_top.html）を参照する。

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
稲	エクシードフロアブル	ｳﾝｶ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ	収穫7日前まで	3回以内
	エミリアフロアブル	ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ ｳﾝｶ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ	収穫7日前まで	2回以内
	オリブライト２５０Ｇ	いもち病 稲こうじ病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 紋枯病	出穂10日前まで(但し､収穫45日前まで)	1回
	カスミン液剤	いもち病	穂揃期まで	2回以内
	キラップフロアブル	ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ ｳﾝｶ類 ｶﾒﾑｼ類	収穫14日前まで	2回以内
	コラトップ１キロ粒剤１２	いもち病	葉いもちに対しては初発10日前～初発時､穂いもちに対しては出穂30日前～5日前まで	2回以内
	スクミノン	ｽｸﾐﾘﾝｺﾞｶﾞｲ	収穫60日前まで	2回以内
	スクミンベイト３	ｽｸﾐﾘﾝｺﾞｶﾞｲ	発生時	-
	スタークル液剤１０	ｳﾝｶ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ	収穫7日前まで	3回以内
	スミチオン乳剤	ｶﾒﾑｼ類 ﾆｶﾒｲﾁｭｳ	収穫21日前まで	2回以内
	ダブルカットフロアブル	いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	穂揃期まで 穂揃期まで	2回以内 2回以内
	トップジンＭゾル	いもち病 変色米(ｴﾋﾟｺｯｶﾑ菌) 紋枯病	収穫14日前まで	3回以内
	トライフロアブル	いもち病 稲こうじ病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	収穫14日前まで	2回以内
	ブラシンフロアブル	いもち病 ごま葉枯病 もみ枯細菌病 稲こうじ病 褐条病 内穎褐変病 変色米(ｱﾙﾀﾅﾘｱ菌) 変色米(ｴﾋﾟｺｯｶﾑ菌) 変色米(ｶｰﾌﾞﾗﾘｱ菌)	収穫7日前まで	2回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
稲	ブラシンフロアブル	穂枯れ(ごま葉枯病菌)	収穫7日前まで	2回以内
	マトリックフロアブル	ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ	収穫7日前まで	2回以内
	モンカットフロアブル	紋枯病	収穫14日前まで	4回以内
水稲	チューンアップ顆粒水和剤	ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ	発生初期(但し、収穫前日まで)	-
麦類	ワークアップフロアブル	うどんこ病 黄斑病 黒点病 赤かび病 赤さび病	収穫7日前まで	3回以内
麦類(小麦を除く)	トップジンＭゾル	赤かび病	収穫21日前まで	3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
麦類(大麦、小麦を除く)	スミチオン乳剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫14日前まで	1回
小麦	シルバキュアフロアブル	うどんこ病 赤かび病 赤さび病	収穫7日前まで	2回以内
	スミチオン乳剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫7日前まで	1回
	チルト乳剤２５	赤かび病 なまぐさ黒穂病	収穫7日前まで 根雪前	3回以内 2回以内
	トップジンＭゾル	赤かび病	収穫14日前まで	3回以内(但し、出穂期以降は2回以内)
	ミラビスフロアブル	赤かび病	収穫7日前まで	2回以内
大麦	シルバキュアフロアブル	うどんこ病 赤かび病	収穫14日前まで	2回以内
	スミチオン乳剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫7日前まで	1回
	チルト乳剤２５	赤かび病	収穫21日前まで	1回
	ミラビスフロアブル	赤かび病	収穫14日前まで	2回以内
未成熟とうもろこし	ベネビアＯＤ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ	収穫前日まで	3回以内
	ヨーバルフロアブル	ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ	収穫前日まで	3回以内
かんしょ	アクセルフロアブル	ﾅｶｼﾞﾛｼﾀﾊﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾂﾓﾝｶﾒﾉｺﾊﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
	アミスター２０フロアブル	基腐病	収穫14日前まで	3回以内
	コテツフロアブル	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫前日まで	2回以内
	フェニックス顆粒水和剤	ﾅｶｼﾞﾛｼﾀﾊﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫前日まで	2回以内
	プレオフロアブル	ﾅｶｼﾞﾛｼﾀﾊﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫7日前まで	2回以内
	プレバソンフロアブル５	ﾅｶｼﾞﾛｼﾀﾊﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫前日まで	3回以内
	ベネビアＯＤ	ﾅｶｼﾞﾛｼﾀﾊﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾂﾓﾝｶﾒﾉｺﾊﾑｼ	収穫7日前まで	3回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
ばれいしょ	Ｚボルドー	軟腐病	-	-
	アドマイヤー顆粒水和剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｵｵﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ	収穫14日前まで	2回以内
	ウララＤＦ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫7日前まで	2回以内
	エキナイン顆粒水和剤	疫病	収穫7日前まで	4回以内
	クミガードＳＣ	軟腐病	-	-
	ジマンダイセン水和剤	疫病	収穫7日前まで	3回以内
	ゾーベック　エンカンティア　ＳＥ	疫病	収穫14日前まで	3回以内
	ダコニール１０００	疫病 夏疫病	収穫7日前まで	5回以内
	トランスフォームフロアブル	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫7日前まで	3回以内
	プレオフロアブル	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫7日前まで	2回以内
	プロポーズ顆粒水和剤	疫病 夏疫病	収穫7日前まで	5回以内
	ベネビアＯＤ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｼﾞｬｶﾞｲﾓｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫7日前まで	3回以内
	ホライズンドライフロアブル	疫病	収穫14日前まで	4回以内
	モベントフロアブル	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫7日前まで	3回以内
	ライメイフロアブル	疫病	収穫7日前まで	4回以内
	ランマンフロアブル	疫病	収穫7日前まで	4回以内
	リライアブルフロアブル	疫病	収穫7日前まで	3回以内
	レーバスフロアブル	疫病	収穫7日前まで	2回以内
えだまめ	スタークルメイト液剤１０	ｶﾒﾑｼ類 ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	収穫7日前まで	2回以内
	スタークル液剤１０	ｶﾒﾑｼ類 ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	収穫7日前まで	2回以内
	フェニックスフロアブル	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾈｷﾘﾑｼ類 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫前日まで	3回以内
	プレバソンフロアブル５	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	収穫3日前まで	3回以内
	ブロフレアＳＣ	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ ﾏﾒﾊﾝﾐｮｳ	収穫前日まで	3回以内
	ベネビアＯＤ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	収穫前日まで 収穫前日まで 収穫前日まで	3回以内 3回以内 3回以内
はなやさい類	パレード２０フロアブル	菌核病 黒すす病	収穫前日まで	3回以内
	ピシロックフロアブル	べと病	収穫前日まで	2回以内
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ	Ｚボルドー	黒腐病	-	-

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ	アクセルフロアブル	ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	2回以内
	アドマイヤーフロアブル	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫3日前まで	2回以内
	アファーム乳剤	ｱｵﾑｼ ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫3日前まで	3回以内
	カスケード乳剤	ｱｵﾑｼ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫7日前まで	2回以内
	コルト顆粒水和剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫前日まで	3回以内
	スタークルメイト液剤１０	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫3日前まで	2回以内
	ディアナＳＣ	ｱｵﾑｼ ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫前日まで	2回以内
	トップジンＭゾル	菌核病	収穫14日前まで	2回以内
	トルネードエースＤＦ	ｱｵﾑｼ ｳﾜﾊﾞ類 ｺﾅｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫14日前まで	2回以内
	フェニックス顆粒水和剤	ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	2回以内
	プレオフロアブル	ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫7日前まで	2回以内
	プレバソンフロアブル５	ｱｵﾑｼ ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｺﾅｶﾞ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫前日まで	3回以内
	ベネビアＯＤ	ｱｵﾑｼ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫前日まで	3回以内
	モベントフロアブル	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫7日前まで	3回以内
	ヨーバルフロアブル	ｱｵﾑｼ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾜﾊﾞ類 ｺﾅｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	収穫前日まで	3回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ	ヨーバルフロアブル	ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
ｷｬﾍﾞﾂ	Ｚボルドー	黒腐病 軟腐病	-	-
	アクセルフロアブル	ｱｵﾑｼ ｳﾜﾊﾞ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
	アドマイヤーフロアブル	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫7日前まで	2回以内
	アファーム乳剤	ｱｵﾑｼ ｺﾅｶﾞ ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
	カスケード乳剤	ｱｵﾑｼ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｺﾅｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫7日前まで	2回以内
	スクレアフロアブル	菌核病	収穫前日まで	3回以内
	スタークルメイト液剤１０	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫3日前まで	2回以内
	スタークル液剤１０	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫3日前まで	2回以内
	トルネードエースＤＦ	ｱｵﾑｼ ｳﾜﾊﾞ類 ｺﾅｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫7日前まで	2回以内
	パレード２０フロアブル	菌核病	収穫前日まで	3回以内
	フェニックス顆粒水和剤	ｱｵﾑｼ ｳﾜﾊﾞ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
	プレオフロアブル	ｱｵﾑｼ ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫7日前まで	2回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
ｷｬﾍﾞﾂ	プレオフロアブル	ﾖﾄｳﾑｼ	収穫7日前まで	2回以内
	プレバソンフロアブル５	ｱｵﾑｼ ｳﾜﾊﾞ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｺﾅｶﾞ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
	モベントフロアブル	ｱｵﾑｼ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｶﾞ	収穫7日前まで	3回以内
	ヨーバルフロアブル	ｱｵﾑｼ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾜﾊﾞ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｺﾅｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
	ランマンフロアブル	べと病	収穫3日前まで	4回以内
ﾚﾀｽ	アドマイヤーフロアブル	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫3日前まで	2回以内
	アファーム乳剤	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾅﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	収穫3日前まで	3回以内
	アミスター２０フロアブル	べと病	収穫7日前まで	4回以内
	トルネードエースＤＦ	ｳﾜﾊﾞ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫7日前まで	2回以内
	パレード２０フロアブル	灰色かび病 菌核病	収穫前日まで	3回以内
	フェニックスフロアブル	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ	収穫前日まで	2回以内
	フェニックス顆粒水和剤	ｳﾜﾊﾞ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	2回以内
	プレバソンフロアブル５	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
	モベントフロアブル	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫7日前まで	3回以内
	ヨーバルフロアブル	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾜﾊﾞ類	収穫前日まで	3回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
ﾚﾀｽ	ヨーバルフロアブル	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾖﾄｳﾑｼ	収穫前日まで	3回以内
かんきつ	ＩＣボルドー６６Ｄ	かいよう病 そうか病 幹腐病 黒点病	-	-
		ｶﾀﾂﾑﾘ類 ﾅﾒｸｼﾞ類	発生前～発生初期	-
	アクセルフロアブル	ｱｹﾞﾊ類 ｺﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ ﾐｶﾝﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ	収穫7日前まで	3回以内
	アグリメック	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ ﾐｶﾝｻﾋﾞﾀﾞﾆ ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ	収穫7日前まで	3回以内
	アドマイヤーフロアブル	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ｺﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ成虫 ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ	収穫14日前まで(但し､露地栽培については発芽期から開花期を除く)	3回以内
	エクシレルＳＥ	ｱｹﾞﾊ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｶﾈﾀﾀｷ ｹｼｷｽｲ類 ｹﾑｼ類 ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ｺﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ成虫 ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ ﾐｶﾝﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ	開花期まで	3回以内
	コルト顆粒水和剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	収穫前日まで	3回以内
	ダニコングフロアブル	ﾐｶﾝﾊﾀﾞﾆ	収穫前日まで	1回
	ダントツ水溶剤	ｱｶﾏﾙｶｲｶﾞﾗﾑｼ ｱｹﾞﾊ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｶﾈﾀﾀｷ ｶﾒﾑｼ類 ｹｼｷｽｲ類 ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ類	収穫前日まで	3回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
かんきつ	ダントツ水溶剤	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｺﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ ﾂﾉﾛｳﾑｼ ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ	収穫前日まで	3回以内
	デランフロアブル	そうか病 黒点病	収穫30日前まで	3回以内
	ナティーボフロアブル	そうか病 灰色かび病 黒点病 炭疽病(さび果) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	3回以内
	パレード１５フロアブル	灰色かび病	収穫7日前まで	2回以内
	モベントフロアブル	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 ｻﾋﾞﾀﾞﾆ類 ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ	収穫7日前まで	3回以内
	ロンセラーフロアブル	そうか病 灰色かび病	収穫前日まで	3回以内
かんきつ(みかんを除く)	ジマンダイセン水和剤	黒点病	収穫90日前まで	4回以内
	トップジンＭゾル	貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	5回以内
	ベルクートフロアブル	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	2回以内
	ベンレート水和剤	貯蔵病害(黒斑病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	2回以内
みかん	ジマンダイセン水和剤	黒点病	収穫30日前まで	4回以内
	トップジンＭゾル	貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	5回以内
	ベルクートフロアブル	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	3回以内
	ベンレート水和剤	貯蔵病害(黒斑病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	4回以内
まつ(生立木)	エコワン３フロアブル	ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ成虫	成虫発生初期及び発生最盛期直前 成虫発生直前又は発生初期	3回以内 3回以内
	スミパインＭＣ	ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ成虫	成虫発生初期	3回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
	スミパイン乳剤	ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ成虫	成虫の発生直前～発生最盛期直前	6回以内
	マツグリーン液剤２	ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ成虫	成虫発生初期及び発生最盛期直前	5回以内
	モリエートＳＣ	ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ成虫	成虫の発生初期及び発生最盛期直前	4回以内
飼料用とうもろこし	チルト乳剤２５	すす紋病	収穫7日前まで	2回以内
飼料用とうもろこし(子実)	プレバソンフロアブル５	ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ	収穫前日まで	3回以内