

## 別紙

## 令和2年度静岡県農薬安全使用指針・農作物病害虫防除基準の訂正事項について

1. 掲載を追加した農薬情報<sup>(※)</sup>

農薬名	登録上の作物名称	適用病害虫名称	希釈倍数・使用量	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
フジワン粒剤	稲	稲こうじ病	3~4kg/10a	-	出穂10~30日前(但し、収穫30日前まで)	2回以内	湛水散布
コラトップリンバー粒剤	稲	いもち病	3~4kg/10a	-	出穂30~5日前まで	2回以内	散布
トライフロアブル	稲	いもち病	1000倍	60~150L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布
エクシードフロアブル	稲	ウカ類	2000倍	60~150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布
エクシードフロアブル	稲	カメシ類	2000倍	60~150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布
ダブルシューターSE	花き類・観葉植物	ハダニ類	1000倍	100~300L/10a	発生初期	2回以内	散布
ダブルシューターSE	花き類・観葉植物	アザミヤ類	1000倍	100~300L/10a	発生初期	2回以内	散布
パレード20フロアブル	花き類・観葉植物(ばら、きくを除く)	うどんこ病	4000倍	100~300L/10a	発病初期	3回以内	散布
パレード20フロアブル	ばら	うどんこ病	4000倍	100~300L/10a	発病初期	3回以内	散布
モレスタン水和剤	ばら	うどんこ病		20g/100m <sup>3</sup> (50m <sup>2</sup> ×2m)	-	10回以内	くん煙
パレード20フロアブル	ばら	黒星病	4000倍	100~300L/10a	発病初期	3回以内	散布
オルトラン粒剤	つつじ類	ツツジゲンハイ	12kg/10a	-	発生初期	5回以内	株元散布
ダコニール1000	つつじ類	褐斑病	1000倍	200~700L/10a	-	6回以内	散布

2. 訂正して削除した農薬情報<sup>(※)</sup>

ビームズル	稲	いもち病	1000倍	-	収穫7日前まで	3回以内	散布
バンタック粉剤DL	チューリップ	葉腐病	20kg/10a	-	植付前	1回	土壌混和

※ 令和2年4月27日時点の農薬情報をもとに作成しています。