稲の種子消毒薬剤一覧表　　令和7年1月31日現在

農薬名	農薬種類名	回数	使用時期	希釈倍数・使用量	使用方法名称	イネシンガレセンチュウ	いもち病	ごま葉枯病	ばか苗病	もみ枯細菌病	褐条病	苗立枯細菌病	苗立枯病（トリコデルマ菌）	苗立枯病（ピシウム菌）	苗立枯病（フザリウム菌）	苗立枯病（リゾープス菌）
エコフィット	醸造酢液剤	1回	催芽時	100～200倍	24時間種子浸漬						○					
				100倍	24時間種子浸漬					○		○				
			催芽前	100～200倍	24時間種子浸漬						○					
エコホープDJ	トリコデルマ　アトロビリデ水和剤	–	催芽時	200倍	24時間種子浸漬		○		○	○	○	○				○
			浸種前～催芽前	200倍	24～48時間種子浸漬		○		○	○	○	○				○
スミチオン乳剤	MEP乳剤	1回	は種前	1000倍	6～72時間浸漬	○										
				100倍	専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理又は塗沫処理	○										
タフブロック	タラロマイセス フラバス水和剤	–	催芽時	200倍	24時間種子浸漬		○		○	○	○	○	○		○	○
			催芽前	200倍	24～48時間種子浸漬		○		○	○		○	○		○	○
			浸種前	20倍	1時間種子浸漬								○		○	○
				種子重量の2～4%	湿粉衣		○		○	○		○				
				種子重量の4%	湿粉衣								○		○	○
			浸種前～催芽前	20倍	1時間種子浸漬		○		○	○		○				
テクリードCフロアブル	イプコナゾール・銅水和剤	1回	浸種前	200倍	24時間種子浸漬		○	○	○	○	○	○	○			○
				20倍	10分間種子浸漬		○	○	○	○	○	○	○			○
				4倍（使用量は乾燥種籾1kgあたり希釈液20ミリリットル）	種子吹き付け処理（種子消毒機使用）又は種子塗沫処理		○	○	○	○	○	○	○			○
				7.5倍（使用量は乾燥種籾1kgあたり希釈液30ミリリットル）	種子吹き付け処理（種子消毒機使用）又は種子塗沫処理		○	○	○	○	○	○	○			○
				原液（使用量は乾燥種籾1kgあたり原液5ミリリットル）	種子塗沫処理		○	○	○	○	○	○	○			○
トリフミン水和剤	トリフルミゾール水和剤	1回	浸種前	300倍	24～48時間種子浸漬		○	○	○							
				30倍	10分間種子浸漬		○	○	○							
				7.5～15倍（乾燥種籾1kgあたり30ミリリットル）	種子吹き付け処理（種子消毒機使用）		○	○	○							
				乾燥籾重量の0.5%	種子粉衣（湿粉衣）		○	○	○							
パダンSG水溶剤	カルタップ水溶剤	1回	浸種前	1500～3000倍	24時間種もみ浸漬	○										

稲の種子消毒薬剤一覧表

令和7年1月31日現在

農薬名	農薬種類名	回数	使用時期	希釈倍数・使用量	使用方法名称	イネシンガレセンチュウ	いもち病	ごま葉枯病	ばか苗病	もみ枯細菌病	褐条病	苗立枯細菌病	苗立枯病（トリコデルマ菌）	苗立枯病（ピシウム菌）	苗立枯病（フザリウム菌）	苗立枯病（リゾープス菌）
ベンレートT水和剤20	チウラム・ベノミル水和剤	1回	浸種前	200倍	24～48時間種子浸漬	○	○	○	○							
					6～24時間種子浸漬		○		○							
				20倍	10分間種子浸漬	○	○	○	○		○		○	○	○	○
				3.75倍（乾燥種籾1kgあたり希釈液30ミリリットル）	種子吹き付け処理（種子消毒機使用）又は塗沫処理					○						
				400倍	24～48時間種子浸漬		○		○							
				7.5倍（乾燥種籾1kgあたり希釈液30ミリリットル）	種子吹き付け処理（種子消毒機使用）又は塗沫処理	○	○	○	○							
				乾燥種籾重量の0.5～1%	種子粉衣（湿粉衣）	○	○	○	○		○		○	○	○	○
				乾燥種籾重量の1%	種子粉衣（湿粉衣）					○						
モミガードC・DF	銅・フルジオキソニル・ペフラゾエート水和剤	1回	浸種前	200倍	24時間種子浸漬		○	○	○	○	○	○	○		○	○
				7.5倍（使用量は乾燥種籾1kgあたり希釈液30ミリリットル）	吹き付け処理（種子消毒機使用）又は塗沫処理		○	○	○	○	○	○	○		○	○
モミガードC水和剤	銅・フルジオキソニル・ペフラゾエート水和剤	1回	浸種前	200倍	24時間種子浸漬		○	○	○	○	○	○	○		○	○
				7.5倍（使用量は乾燥種籾1kgあたり希釈液30ミリリットル）	吹き付け処理（種子消毒機使用）又は塗沫処理		○	○	○	○	○	○	○		○	○
				乾燥種籾重量の0.5%	種子粉衣（湿粉衣）		○	○	○	○	○	○	○		○	○

直播水稲の種子消毒薬剤一覧表

農薬名	農薬種類名	回数	使用時期	希釈倍数・使用量	使用方法名称	ウンカ類	ツマグロヨコバイ
ルミスパンスFS	トリフルメゾピリム水和剤	1回	は種前	（湛水直播水稲）乾燥種もみ1kg当り原液7～9ml	種子吹き付け処理又は塗抹処理	○	○
				（乾田直播水稲）乾燥種もみ1kg当り原液5～9ml			