

# 水稲用ブームスプレーヤに使用できる薬剤

(令和4年12月31日現在)

農薬名	対象病害虫名称	使用時期	希釈倍率	回数
エクシードフロアブル	ウンカ類・カメムシ類・ツマグロヨコバイ	収穫7日前まで	500倍	3回以内
エミリアフロアブル	イネドロオイムシ・ウンカ類・カメムシ類・ツマグロヨコバイ	収穫7日前まで	250倍	2回以内
キラップフロアブル	イネドロオイムシ・ウンカ類・カメムシ類	収穫14日前まで	500倍	2回以内
スタークル液剤10	ウンカ類・カメムシ類	収穫7日前まで	300倍	3回以内
スミチオン乳剤	カメムシ類・ニカメイチュウ	収穫21日前まで	300倍	2回以内
ダブルカットフロアブル	いもち病・穂枯れ(ごま葉枯病菌)	穂揃期まで	300倍	2回以内
ダントツ水溶剤	イネドロオイムシ・ウンカ類・カメムシ類	収穫7日前まで	1000倍	3回以内
トライフロアブル	いもち病・稲こうじ病・穂枯れ(ごま葉枯病菌)	収穫14日前まで	250倍	2回以内
トレボンEW	ウンカ類・ツマグロヨコバイ	収穫14日前まで	300倍	3回以内
トレボン乳剤	ウンカ類	収穫14日前まで	300～600倍	3回以内
	イネドロオイムシ・イネミズゾウムシ・ツマグロヨコバイ		300倍	3回以内
	カメムシ類		600倍	3回以内
バリダシン液剤5	紋枯病	収穫14日前まで	300倍	5回以内
ブラシンフロアブル	いもち病・稲こうじ病・褐条病・ごま葉枯病・内穎褐変病・墨黒穂病・もみ枯細菌病・穂枯れ(ごま葉枯病菌)・変色米(アルタナリア菌)・変色米(エピコッカム菌)・変色米(カーバラリア菌)	収穫7日前まで	300倍	2回以内
モンカットフロアブル	紋枯病	収穫14日前まで	300倍	3回以内

\* 本項は、農作物病害虫防除基準に掲載している農薬のうち、水稲ブームスプレーヤに使用可能な農薬を抜粋した資料です。