

静岡県病害虫防除基準に採用している農薬のうち、無人航空機で使用できる薬剤一覧

令和5年2月現在

本県の主要農作物のうち、無人航空機による防除が実施、または実施見込みの作目について、防除基準掲載剤をまとめた。

無人航空機で使用できる水稲の除草剤及び植物成長調整剤は、それぞれの項目を参照する。

各薬剤の詳細は、ホームページ「産業用無人航空機用農薬」(URL: https://mujiin-heri.jp/index_top.html)を参照する。

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
稲	エクシードフロアブル	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	収穫7日前まで	3回以内
	エミリアフロアブル	イトライムシ ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	収穫7日前まで	2回以内
	オリブライト250G	いもち病 稲こうじ病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 墨黒穂病 紋枯病	出穂10日前まで (但し、収穫45日 前まで)	1回
	カスミン液剤	いもち病	穂揃期まで	2回以内
	キラップフロアブル	イトライムシ ウンカ類 カメムシ類	収穫14日前まで	2回以内
	コラトップ1キロ粒剤 12	いもち病	葉いもちに対して は初発10日前～初 発時、穂いもちに 対しては出穂30日 前～5日前まで	2回以内
	スクミノン	スクミリンゴガイ	収穫60日前まで	2回以内
	スクミンベイト3	スクミリンゴガイ	発生時	-
	スタークル液剤10	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	収穫7日前まで	3回以内
	スミチオン乳剤	カメムシ類 ニカメイト	収穫21日前まで	2回以内
	ダブルカットフロアブル	いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	穂揃期まで	2回以内
	トップジンMゾル	いもち病 変色米(エビコッカム菌) 墨黒穂病 紋枯病	収穫14日前まで	3回以内
	トライフロアブル	いもち病 稲こうじ病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	収穫14日前まで	2回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
稲	ブラシフロアブル	いもち病 ごま葉枯病 もみ枯細菌病 稲こうじ病 褐条病 内穎褐変病 変色米（アルタリア菌） 変色米（エビコッカム菌） 変色米（カーブリア菌） 穂枯れ（ごま葉枯病菌） 墨黒穂病	収穫7日前まで	2回以内
	モンカットフロアブル	紋枯病	収穫14日前まで	3回以内
水稲	チューンアップ顆粒 水和剤	フタヒコヤガ	発生初期（但し、 収穫前日まで）	-
麦類	ワークアップフロアブル	うどんこ病 黄斑病 黒点病 赤かび病 赤さび病 雪腐小粒菌核病 網斑病	収穫7日前まで	3回以内
麦類(小麦を除く)	トップジンMゾル	赤かび病	収穫21日前まで	3回以内（但し、出 穂期以降は1回以 内）
		雪腐大粒菌核病	根雪前	
麦類(大麦、小麦を除く)	スミチオン乳剤	アブラムシ類	収穫14日前まで	1回
小麦	シルバキュアフロアブル	うどんこ病	収穫7日前まで	2回以内
		赤かび病		
		赤さび病		
		雪腐小粒菌核病		
	スミチオン乳剤	アブラムシ類	収穫7日前まで	1回
	チルト乳剤2.5	なまぐさ黒穂病	根雪前	2回以内
		赤かび病	収穫7日前まで	3回以内
		雪腐小粒菌核病	根雪前	2回以内
	トップジンMゾル	赤かび病	収穫14日前まで	3回以内（但し、出 穂期以降は2回以 内）
		雪腐大粒菌核病	根雪前	
ベフトップジンフロアブル	赤かび病	収穫14日前まで	3回以内（但し、出 穂期以降は1回以 内）	
ミラビスフロアブル	赤かび病	収穫7日前まで	2回以内	
ランマンフロアブル	褐色雪腐病	根雪前	3回以内	
大麦	シルバキュアフロアブル	うどんこ病	収穫14日前まで	2回以内
		赤かび病		
	スミチオン乳剤	アブラムシ類	収穫7日前まで	1回
	チルト乳剤2.5	赤かび病	収穫21日前まで	1回
ミラビスフロアブル	赤かび病	収穫14日前まで	2回以内	

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数	
ばれいしょ	アドマイヤー顆粒水和剤	アブラムシ類 オニジューバホシテトウ	収穫14日前まで	2回以内	
	エキナイン顆粒水和剤	疫病	収穫7日前まで	4回以内	
	クプロシールド	疫病 軟腐病	-	-	
	コルト顆粒水和剤	アブラムシ類	収穫前日まで	3回以内	
	ジマンダイセン水和剤	疫病	収穫7日前まで	3回以内	
	ゾーベック エンカン ティア SE	疫病	収穫14日前まで	3回以内	
	ダコニール1000	疫病 夏疫病	収穫7日前まで	5回以内	
	プロポーズ顆粒水和剤	疫病 夏疫病	収穫7日前まで 収穫7日前まで	5回以内 5回以内	
	ベネビアOD	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	収穫7日前まで	3回以内	
	ホライズンドライフフロアブル	疫病	収穫14日前まで	4回以内	
	モベントフロアブル	アブラムシ類	収穫7日前まで	3回以内	
	ライメイフロアブル	疫病	収穫7日前まで	4回以内	
	ランマンフロアブル	疫病	収穫7日前まで	4回以内	
	レーバスフロアブル	疫病	収穫7日前まで	2回以内	
	キャベツ	Zボルドー	黒腐病	-	-
		アクセルフロアブル	アオムシ ウワバチ類 オオタバコガ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	収穫前日まで	3回以内
アドマイヤーフロアブル		アブラムシ類	収穫7日前まで	2回以内	
アフーム乳剤		アオムシ コナガ タマキソウワバ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	収穫前日まで	3回以内	
カスケード乳剤		アオムシ アザミウマ類 オオタバコガ コナガ シロイチモンズヨトウ タマキソウワバ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	収穫7日前まで	2回以内	
コルト顆粒水和剤		アブラムシ類	収穫前日まで	3回以内	
スタークル液剤10		アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数				
キャベツ	トルネードエースDF	アオムシ	収穫7日前まで	2回以内				
		ウリハ 類						
		コナガ						
		ハイマダ ラノメイガ						
		ハスモンヨトウ						
		ヨトウムシ						
		ノーモルト乳剤			コナガ	収穫7日前まで	2回以内	
		パレード20フロアブル			菌核病	収穫前日まで	3回以内	
フェニックス顆粒水和剤	アオムシ	ウリハ 類	収穫前日まで	3回以内				
					オオタバコガ			
					コナガ			
					ハスモンヨトウ			
					ヨトウムシ			
					プレバソンフロアブル5	アオムシ	収穫前日まで	3回以内
					ウリハ 類			
					オオタバコガ			
コナガ								
ハイマダ ラノメイガ								
ハスモンヨトウ								
ヨトウムシ								
ベネビアOD	アオムシ	アザミウマ類	収穫前日まで	3回以内				
					アブラムシ類			
					ウリハ 類			
					オオタバコガ			
					コナガ			
					シロイチモンジヨトウ			
					ハイマダ ラノメイガ			
					ハスモンヨトウ			
					ヨトウムシ			
					モベントフロアブル	アオムシ	アザミウマ類	収穫7日前まで
アブラムシ類								
コナガ								
ヨーバルフロアブル	アオムシ	アザミウマ類	収穫前日まで	3回以内				
					アブラムシ類			
					ウリハ 類			
					オオタバコガ			
					コナガ			
					シロイチモンジヨトウ			
					ハイマダ ラノメイガ			
					ハスモンヨトウ			
					ヨトウムシ			

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
かんきつ	I Cポルドー66D	かいよう病	-	-
	アグリメック	アザミウマ類 チャノホリダニ ミカンサビダニ ミカンハダニ	収穫7日前まで	3回以内
	アドマイヤーフロアブル	アザミウマ類 アブラムシ類 カメムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンキジラミ ミカンハダニ ミカンハダニ	収穫14日前まで (但し、露地栽培 については発芽期 から開花期を除 く)	3回以内
	ダントツ水溶剤	アオハダコトメ アカカキイガラムシ アゲハ類 アザミウマ類 アブラムシ類 カネタキ カメムシ類 ケシキイ類 コアオハダミドリ コナカキイガラムシ類 コナジラミ類 ゴマダラカミキリ ツノロウムシ ナシマルカキイガラムシ ミカンキジラミ ミカンハダニ ミカンハダニ	収穫前日まで	3回以内
	デランフロアブル	そうか病 黒点病	収穫30日前まで	3回以内
	ナティーボフロアブル	そうか病 灰色かび病 黒点病 炭疽病(さび果) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	3回以内
	モベントフロアブル	アザミウマ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 サビダニ類 チャノホリダニ	収穫7日前まで	3回以内

作物名称	商品名屋号抜き	適用病害虫名称	使用時期	本剤の使用回数
かんきつ(みかんを除く)	ジマンダイセン水和剤	黒点病	収穫90日前まで	4回以内
	トップジンMゾル	貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	5回以内
	ベフトップジンフロアブル	貯蔵病害(こうじかび病) 貯蔵病害(すす斑病) 貯蔵病害(黒斑病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	2回以内
みかん	ジマンダイセン水和剤	黒点病	収穫30日前まで	4回以内
	スミチオン乳剤	アザミヤ類 ケシキイ類 コアオハムグリ	収穫14日前まで	5回以内
	トップジンMゾル	貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫前日まで	5回以内
	ベフトップジンフロアブル	貯蔵病害(こうじかび病) 貯蔵病害(すす斑病) 貯蔵病害(黒斑病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫7日前まで	3回以内
	ベルコートフロアブル	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	収穫3日前まで	3回以内
	エコワン3フロアブル	マツノダラガミキ成虫	成虫発生初期及び 発生最盛期直前	3回以内
まつ(生立木)	スミパインMC	マツノダラガミキ成虫	成虫発生初期	3回以内
	スミパイン乳剤	マツノダラガミキ成虫	成虫の発生直前～ 発生最盛期直前	6回以内
	マツグリーン液剤2	マツノダラガミキ成虫	成虫発生初期及び 発生最盛期直前	5回以内
	モリエートSC	マツノダラガミキ成虫	成虫の発生初期及び 発生最盛期直前	4回以内
	飼料用とうもろこし	チルト乳剤25	すす紋病	収穫7日前まで