（6）水稲除草剤の使用時期と適応草種

水稲除草剤の使用時期の晩限はノビエの葉齢で表記されているが、ノビエの発生が少ない圃場や他の雑草の発生が早い圃場などについては適宜、使用時期を早める必要がある。
新たに登録された剤(再登録を含む）については、土壌区分が登録案件から外れたため空欄とした。メーカーの注意書き等に留意して処理すること。

ア　一発処理剤（粒剤）

令和6年11月18日現在

除草剤名	成分数	普通期				早期				使用時期	田植同時	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
		埴土	壌土	壌土	砂壌土	埴土	壌土	壌土	砂壌土				1年生雑草		多年生雑草														
													ノビエ	広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	クリカワ	ミズガヤツリ	オモダカ	ヘラオモダカ	クログワイ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	シズイ				
アールタイプ１キロ粒剤 シュナイデン１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、退色、白化	
アカツキ１キロ粒剤	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	分げつ抑制、生育抑制、葉身細化	
アクシズＭＸ１キロ粒剤	3									移植後7日～ﾉﾋﾞｴ４葉期 但し、収穫45日前まで		ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
アシュラ１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ４葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	生育抑制、葉鞘褐変、退色	
アッパレＺ１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
アピログロウMX１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	生育抑制	
イネキング１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○	生育抑制	
エンペラー１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し収穫60日前まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
カイリキＺ１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	生育抑制、白化	
カウンシルエナジー１キロ粒剤 カウントダウン１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
カウンシルコンプリート１キロ粒剤 ボデーガードプロ１キロ粒剤	2									移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	キシュウスズメノヒエに防除効果高い。 ホソバヒメミソハギの発生が多いほ場では使用しない。
カチドキＺ１キロ粒剤	2									移植直後～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉身細化、分げつ抑制、ロール葉	
カチボシ１キロ粒剤５１	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	生育抑制	
キマリテ１キロ粒剤	2									移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	生育抑制	
キラリ１キロ粒剤 カラット１キロ粒剤	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
銀河１キロ粒剤	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ３葉期 但し収穫60日前まで	○	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
クサウェポン１キロ粒剤 ジャスタ１キロ粒剤	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化	
コメット１キロ粒剤	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
忍１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
ジャンダルムＭＸ１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	発芽阻害、白化、生育抑制	
ジェイフレンド１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
ジェイソウル１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	生育抑制、白化	
シリウスエグザ１キロ粒剤	4									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	生育抑制	
シリウスターボ１キロ粒剤	4									移植後３日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	生育抑制	
シンズイＺ１キロ粒剤	4									移植直後～ノビエ４葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	生育抑制、流れ葉	
ストレングス１キロ粒剤	3									移植後５日～ノビエ４葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	白化、生育抑制、ロール葉	
セイテン１キロ粒剤	4									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	生育抑制、葉先枯れ、 分げつ抑制、葉身細	
ディオーレ１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	生育抑制、白化、分げつ抑制	
テッシン１キロ粒剤	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、分げつ抑制、葉身細化	ﾅｶﾞｴﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳに効果有り

ア　一発処理剤（粒剤）

令和6年11月18日現在

除草剤名	成分数	普通期					早期					使用時期	田植同時	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
															1年生雑草		多年生雑草														
		埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	砂土	埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	砂土				ノビエ	広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	オモダカ	ヘラオモダカ	クログワイ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	シズイ				
トップガンＲ１キロ粒剤	4											移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	生育抑制、流れ葉、葉鞘褐変	
ドニチＳ１キロ粒剤	3	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○	生育抑制	
ドリフ１キロ粒剤	4											移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	生育抑制	
半蔵１キロ粒剤	3											移植直後～ノビエ1.5葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
フジグラス粒剤１７	2	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	移植後５日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○		生育抑制	
プライオリティ１キロ粒剤	2											移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	生育抑制	
フルチャージ1キロ粒剤	2	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	移植後７日～ﾉﾋﾞｴ４葉期 但し収穫45日前まで		ヘリ	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○			○	生育抑制	
ベッカク１キロ粒剤	3											移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
ベンケイ１キロ粒剤	3											移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ミスターホームラン１キロ粒剤５１	3	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	移植直後(砂壌土は移植後５日)～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	○	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	生育抑制	
ラオウ１キロ粒剤	4											移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	生育抑制	
流星１キロ粒剤	3											移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	分げつ抑制、葉鞘褐変	

※（　）で示した剤は同成分だが異なる商品名で販売されている剤名。

※　無人航空機散布の詳細は薬剤の登録内容を参照すること。また、「ヘリ」と記載している剤は、「無人ヘリ」で散布登録されているもの。