イ　一発処理剤（ジャンボ剤）

除草剤名	成分数	普通期				早期				使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
		埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	埴土	埴壌土	壌土	砂壌土			1年生雑草		多年生雑草														
												ノビエ	広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	オモダカ	ヘラオモダカ	クログワイ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	シズイ				
アールタイプジャンボ シュナイデンジャンボ	3									移植後３日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、退色、白化	
アカツキ豆つぶ250	3									**移植後3日～ノビエ3葉期 但し、収穫60日前まで**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	分げつ抑制、生育抑制、葉身細化	
アカツキジャンボ	3									移植後3日～ノビエ3葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	分げつ抑制、生育抑制、葉身細化	
アクシズMXジャンボ	3									移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、白化、葉身細化	
アクシズMXエアー粒剤	3									移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、白化、葉身細化	
アシュラジャンボ	3									移植直後～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
アシュラ400FG	3									移植直後～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
アッパレＺジャンボ	3									移植後３日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
アピログロウMXジャンボ	4									移植後３日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	生育抑制	
イネキングジャンボ	3									移植後１日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○	生育抑制	
エンペラージャンボ	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
エンペラー豆つぶ２５０	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	水口処理は田面露出のない状態で行う
カイリキＺジャンボ	3									移植後３日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○				○	生育抑制、白化	
カウンシルコンプリートジャンボ ボデーガードプロジャンボ	2									移植後５日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	生育抑制	ﾎﾘﾊﾞﾋﾒﾐﾘﾊﾞﾎﾞの発生が多いほ場では使用しない。ｷｼｭｳｽｽﾞﾒﾉﾋｴに効果あり
カウントダウンジャンボ カウンシルエナジージャンボ	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	発芽・生育抑制	
カチドキＺ楽粒	2									移植後3日～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	葉身細化、分げつ抑制、ロール葉	
カチボシＬジャンボ	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	生育抑制	
カラットジャンボ	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
カラット400FG	3									移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
ガンガンジャンボ	2									移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
キマリテジャンボ	2									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	生育抑制	
銀河ジャンボ	3									移植後５日～ﾉﾋﾞｴ３葉期 但し収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
クサウェポンジャンボ ジャスタジャンボ	3									移植後１日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、白化	
クサトリーＢＳＸジャンボＬ	3									移植後１日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○				○	生育抑制	
コメットジャンボ	3									移植後５日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
サキガケ楽粒	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	生育抑制、白化、ロール葉	ﾅｶﾞｴﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳに効果有り
サスケーラジカルジャンボ	4									移植後3日～ノビエ２葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	生育抑制	
忍ジャンボ	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
ジャンダルムＭＸジャンボ	3									移植後3日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	生育抑制、白化	
ジャンダルムＭＸ豆つぶ250	3									移植後3日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	生育抑制、白化	
ジェイソウルジャンボ	3									移植後1日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	生育抑制、白化	
ジェイフレンドジャンボ	3									移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
シリウスエグザジャンボ	4									移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	生育抑制	

イ　一発処理剤（ジャンボ剤）

除草剤名	成分数	普通期				早期				使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
		埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	埴土	埴壌土	壌土	砂壌土			1年生雑草		多年生雑草														
												ノビエ	広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	オモダカ	ヘラオモダカ	クログワイ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	シズイ				
シンズイＺ豆つぶ２５０	4									移植後3日～ﾉﾋﾞｴ４葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	生育抑制、流れ葉	
シンズイＺジャンボ	4									移植後3日～ﾉﾋﾞｴ４葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	生育抑制、流れ葉	
セイテンジャンボ	4									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	生育抑制、葉先枯れ、 分げつ抑制、葉身細	
テッシンジャンボ	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、分げつ抑制、葉身細化	ﾅｶﾞｴﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳに効果有り
テッシン豆つぶ２５０	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、分げつ抑制、葉身細化	ﾅｶﾞｴﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳに効果有り
トップガンＲ豆つぶ２５０	4									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	生育抑制、流れ葉、葉鞘褐変	
トップガンＲジャンボ	4									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	生育抑制、流れ葉、葉鞘褐変	
トビキリジャンボ	4									移植後３日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	生育抑制	
ノックアウト楽粒	4									移植後7日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化、葉先枯れ	
プライオリティジャンボ	2									移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
プライオリティ豆つぶ250	2									移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ベッカクジャンボ	3									移植後３日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ベッカク豆つぶ250	3									移植後３日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ベンケイジャンボ	3									移植後３日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
マサカリＬジャンボ	3	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	移植後５日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○		生育抑制	
ミスターホームランＬジャンボ	3	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	移植後３日～ノビエ２葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○				○	○			○		生育抑制	
ラオウジャンボ	4									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	生育抑制	

※（　）で示した剤は同成分だが異なる商品名で販売されている剤名。
※　無人航空機散布の詳細は薬剤の登録内容を参照すること。また、「ヘリ」と記載している剤は、「無人ヘリ」で散布登録されているもの。

ウ　一発処理剤（フロアブル剤）

除草剤名	成分数	普通期				早期				使用時期	田植同時	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
													1年生雑草		多年生雑草														
		埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	埴土	埴壌土	壌土	砂壌土				ノビエ	広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	オモダカ	ヘラオモダカ	クログワイ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	シズイ				
アカツキフロアブル	3									移植後3日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	分げつ抑制、生育抑制、葉身細化	
アシュラフロアブル	3									移植直後～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	生育抑制、葉鞘褐変、退色	
アッパレＺフロアブル	3									移植後３日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
イネキングフロアブル	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				○	生育抑制	
エンペラーフロアブル	3									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
オークスフロアブル	4									移植後５日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	生育抑制	
カイリキＺフロアブル	3									移植後3日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	生育抑制、白化	
カウンシルコンプリートフロアブル ボデーガードプロフロアブル	2									移植後５日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	生育抑制	ホソバヒメミソハギの発生が多いほ場では使用しない。
カウントダウンフロアブル カウンシルエナジーフロアブル	3									移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	発芽・生育抑制	
カラットフロアブル	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
クサウェポンフロアブル ジャスタフロアブル	3									移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化	
サラブレッドＲＸフロアブル	4									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	生育抑制	
ジェイソウルフロアブル	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	生育抑制、白化	
ジェイフレンドフロアブル	3									移植後５日～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
シンズイＺフロアブル	4									移植後3日～ノビエ４葉期 但し移植後30日まで			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	生育抑制、流れ葉	
テッシンフロアブル	3									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	葉鞘褐変、分げつ抑制、葉身細化	
トップガンＲフロアブル	4									移植直後～ノビエ３葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	生育抑制、流れ葉、葉鞘褐変	
ラオウフロアブル	4									移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	生育抑制	

※（　）で示した剤は同成分だが異なる商品名で販売されている剤名。
※　無人航空機散布の詳細は薬剤の登録内容を参照すること。また、「ヘリ」と記載している剤は、「無人ヘリ」で散布登録されているもの。