

エ 初期剤

除草剤名	成分数	普通期		早期		使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項				
		挿土	挿土		挿土			挿土		1年生雑草		多年生雑草																
			黒土	赤土				砂土	黒土	赤土	砂土	ノビエ	広葉雑草	マツハヒ	ホタルイ	ウリカワ	ノビエ	オモダカ	ヒメツバ	クログワ					セリ	ヒメムシ	ヨキバ	シズイ
デルカット乳剤	2							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	

オ 中期剤

除草剤名	成分数	普通期		早期		使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項				
		挿土	挿土		挿土			挿土		1年生雑草		多年生雑草																
			黒土	赤土				砂土	黒土	赤土	砂土	ノビエ	広葉雑草	マツハヒ	ホタルイ	ウリカワ	ノビエ	オモダカ	ヒメツバ	クログワ					セリ	ヒメムシ	ヨキバ	シズイ
アクスズMX 1キロ粒剤	3					移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
アトカラSジャンボMX (セカンドショットSジャンボMX)	3					移植後14日～ノビエ3.5葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、白化、発芽障害	
アトトリ1キロ粒剤	1					移植後14日(イネ5葉期以降)～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			生育抑制	
オシオキMX 1キロ粒剤	3					移植後14日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
カービー1キロ粒剤	3					移植後15日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで		○	○	○	○	○	○								○					○	黄化、ロール葉、生育抑制	
ゲバードジャンボ	4					移植後14日～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	葉鞘褐変、生育抑制、退色	
ザーベックスDX1キロ粒剤	4	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	ロール葉、生育抑制	
ザーベックスSM粒剤	3	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	黄化、ロール葉、生育抑制	
サンパンチ1キロ粒剤	4					移植後15日～ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ツイゲキ豆つぶ250	3					移植後14日(稲5葉期以降)～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	葉先枯れ、生育抑制	
ツイゲキ1キロ粒剤	3					移植後14日(イネ5葉期以降)～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、葉先枯	
ツインスタージャンボ	2					移植後5日～ノビエ3葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ハイカット1キロ粒剤	4					移植後15日～ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ブイゴールSM1キロ粒剤	3	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	ロール葉、生育抑制	
レプラスジャンボ	4					移植後14日～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	葉先枯れ、生育抑制、白化、葉身細化	
ワイドショット1キロ粒剤	2					移植後15日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		

カ 後期剤

除草剤名	成分数	普通期			早期			使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項				
		圃土	壤土	砂土	圃土	壤土	砂土			1年生雑草																				
		○	○	○	○	○	○			多年生雑草																				
アレイルSC	2							移植後25日～ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで ※出穂始期15日前まで		ノビエ	広葉雑草	マツバ	ホタルイ	ウリカワ	シロカサ	オモダカ	ハネササ	クログサ	セリ	ヒメムシ	コキヤク	シズイ		○	薬身細化、分けつ抑制、根抑制					
クリンチャーEW	1							移植後20日～ノビエ6葉期 但し、収穫30日前まで	○ ¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			黄化、生育抑制				
クリンチャーバスメ液剤	2							移植後15日～ノビエ5葉期 但し、収穫50日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	黄化、生育抑制				
グラスジンMナトリウム粒剤、液剤	2	○	○	○	○	×	○	○	○	×	有効分げつ終止期～幼穂形成期前 但し、収穫60日前まで			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	注) 液剤のみ適用あり
トドメMF 1キログ粒剤	1							移植後14日～ノビエ5葉期 但し、収穫50日前まで	○	○																	生育抑制			
トドメMF 乳剤	1							移植後14日～ノビエ7葉期 但し、収穫50日前まで		○																	生育抑制			
バイスコープ 1キログ粒剤 (ルナクロス 1キログ粒剤)	2							移植後14日～60日 但し、収穫45日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、白化			
バサグラン粒剤 (ナトリウム塩)	1							移植後15日～55日 但し、収穫60日前まで			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制			
バサグラン液剤 (ナトリウム塩)	1							移植後15日～55日 但し、収穫50日前まで			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制			
ヒエックパ 1キログ粒剤	1	○	○	○	○	×	○	○	○	×	移植後7日～ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで(使用量1kg/10a)	ヘリ	○			○	○					○	○				○	生育抑制		
								移植後14日～ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで(使用量1.5kg/10a)	ヘリ	○			○	○				○			○	○				○	生育抑制			
フォローアップ1キログ粒剤	2							移植後15日～ノビエ5葉期 (イ4葉期以降、但し収穫60日前まで)	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制			
ワイドアタックD1キログ粒剤	2							移植後15日～ノビエ5葉期 (イ4葉期以降、但し収穫60日前まで)	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制			
ワイドアタックSC	1							移植後20日(イネ5葉期以降)～ノビエ6葉期 但し収穫30日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制			
ワイドパワー粒剤	2	○	○	○	○	×	○	○	○	×	移植後20日～ノビエ5葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制		
モグトン粒剤	1							ウキクサ類、藻類の発生始～発生盛期 但し収穫45日前まで	ヘリ	ウキクサ類、藻類(アミト、アマミト)													○			無人ヘリ散布は河川等飛散に注意				
ロイヤント乳剤	1							移植後20日～ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			ロール葉			

※ 無人航空機散布の詳細は薬剤の登録内容を参照すること。また、「ヘリ」と記載している剤は、「無人ヘリ」で散布登録されているもの。

1) 無人航空機での使用時期は、「移植後20日～ノビエ4.5葉期 (但し、収穫30日前まで)」