エ　初期剤

除草剤名	成分数	普通期				早期				使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
		埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	埴土	埴壌土	壌土	砂壌土			1年生雑草		多年生雑草														
												ノビエ	広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ﾐｽｶﾞﾔﾂﾘ	オモダカ	ﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ	ｸﾛｸﾞﾜｲ	セリ	ﾋﾙﾑｼﾛ	ｺｳｷﾔｶﾞﾗ	ｼｽﾞｲ				
先陣１キロ粒剤	2									移植時、植代後～移植７日前又は移植直後～ノビエ１葉期　ただし、移植後30日まで	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制、葉先枯れ	
先陣ジャンボ	2									植代後～移植７日前又は移植直後～ノビエ１葉期　ただし、移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制、葉先枯れ	
先陣200FG	2									植代後～移植７日前又は移植直後～ノビエ１葉期　ただし、移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	葉鞘褐変、生育抑制、葉先枯れ	
デルカット乳剤	2									植代時（但し、移植４日前まで）		○	○	○	○		○		○	○			○			○	生育抑制	

オ　中期剤

除草剤名	成分数	普通期				早期				使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
		埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	埴土	埴壌土	壌土	砂壌土			1年生雑草		多年生雑草														
												ノビエ	広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ﾐｽｶﾞﾔﾂﾘ	オモダカ	ﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ	ｸﾛｸﾞﾜｲ	セリ	ﾋﾙﾑｼﾛ	ｺｳｷﾔｶﾞﾗ	ｼｽﾞｲ				
アトカラＳジャンボMX セカンドショットＳジャンボMX	3									移植後14日～ﾊﾋﾞｴ3.5葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	生育抑制、白化、発芽障害	
アトトリ１キロ粒剤	1									移植後14日（稲５葉期以降）～ﾊﾋﾞｴ４葉期、但し収穫45日前まで	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			生育抑制	
オシオキMX１キロ粒剤	3									移植後14日～ﾊﾋﾞｴ４葉期 但し、収穫45日前まで	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ゲパードジャンボ	4									移植後14日～ノビエ４葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	葉鞘褐変、生育抑制、退色	
ザーベックスＤＸ1キロ粒剤	4	○	○	○	○	×	○	○	○	×	移植後20～30日 （ノビエ3.5葉期まで）（移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用）		○	○	○	○	○	○	○		○		○			○	○	ロール葉、生育抑制	
ザーベックスＳＭ粒剤	3	○	○	○	○	×	○	○	○	×	移植後20日～ノビエ２葉期 但し、移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○		○						○	黄化、ロール葉、生育抑制	
サンパンチ１キロ粒剤	4									移植後15日～ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
ソニックブームZ１キロ粒剤 グランクロスZ１キロ粒剤	4									移植後14日（稲４葉期以降）～ノビエ４葉期 但し、収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	白化、生育抑制、葉先枯れ、葉身細化	
ツイゲキ豆つぶ250	3									移植後14日（稲５葉期以降）～ノビエ４葉期　但し、収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉先枯れ、生育抑制	
ツイゲキ１キロ粒剤	3									移植後14日（稲５葉期以降）～ノビエ４葉期　但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、葉先枯	
ツインスタージャンボ	2									移植後５日～ノビエ３葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ハイカット１キロ粒剤	4									移植後15日～ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
ブイゴールＳＭ１キロ粒剤	3	○	○	○	○	×	○	○	○	×	移植後15日～ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○				○				○	ロール葉、生育抑制	
レブラスジャンボ	4									移植後14日～ノビエ４葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	葉先枯れ、生育抑制、白化、葉身細化	
ワイドショット１キロ粒剤	2									移植後15日～ﾊﾋﾞｴ４葉期 但し収穫45日前まで	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		

カ　後期剤

除草剤名	成分数	普通期					早期					使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
		埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	砂土	埴土	埴壌土	壌土	砂壌土	砂土			1年生雑草		多年生雑草														
														ノビエ	広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	オモダカ	ヘラオモダカ	クログワイ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	シズイ				
アレイルＳＣ	2											移植後20日～ﾉﾋﾞｴ５葉期 但し、収穫45日前まで ※出穂始期15日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	葉身細化、分げつ抑制、根部抑制	
クリンチャーＥＷ	1											移植後20日～ノビエ６葉期 但し、収穫30日前まで	○[1]	○															黄化、生育抑制	
クリンチャーバスＭＥ液剤	2											移植後15日～ノビエ５葉期 但し、収穫50日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	黄化、生育抑制	
グラスジンMナトリウム液剤	2	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	有効分げつ終止期～幼穂形成期前 但し、収穫60日前まで			○	○	○	○	○		○	○	○		○			○	生育抑制	
トドメＭＦ１キロ粒剤	1											移植後14日～ノビエ５葉期 但し、収穫50日前まで	○	○															生育抑制	
トドメＭＦ乳剤	1											移植後14日～ノビエ７葉期 但し、収穫50日前まで		○															生育抑制	
バイスコープ１キロ粒剤 ルナクロス１キロ粒剤	2											移植後14日～60日 但し、収穫45日前まで	○		○		○	○	○	○	○	○				○		○	生育抑制、白化	
バサグラン粒剤（ナトリウム塩）	1											移植後15日～55日 但し、収穫60日前まで			○	○	○	○	○	○	○	○				○		○	生育抑制	
バサグラン液剤（ナトリウム塩）	1											移植後15日～55日 但し、収穫50日前まで			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	生育抑制	
バサグラン・エアー１キロ粒剤	1											移植後15～55日 但し 収穫60日前 まで	○		○	○	○	○	○	○	○	○						○	生育抑制	
ヒエクッパ１キロ粒剤	1	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	移植後7日～ノビエ４葉期 但し収穫45日前まで（使用量1kg/10a）	ヘリ	○			○	○						○	○			○	生育抑制	
												移植後14日～ノビエ５葉期 但し収穫45日前まで(使用量1.5kg/10a)	ヘリ	○			○	○				○		○	○			○		
フォローアップ1キロ粒剤	2											移植後15日～ノビエ５葉期（稲４葉期以降、但し収穫60日前まで） 但し、収穫60日前まで	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ワイドアタックＤ1キロ粒剤	2											移植後15日～ノビエ５葉期（稲４葉期以降）	ヘリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ワイドアタックＳＣ	1											移植後20日(稲５葉期以降）～ﾉﾋﾞｴ６葉期、但し収穫30日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制	
ワイドパワー粒剤	2	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	移植後20日～ノビエ５葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○				○		○		○	生育抑制	
モゲトン粒剤	1											ウキクサ類、藻類の発生始～発生盛期 但し収穫45日前まで	ヘリ	ウキクサ類、藻類(ｱｵﾐﾄﾞﾛ､ｱﾐﾐﾄﾞﾛ)													○			無人ヘリ散布は河川等飛散に注意
ロイヤント乳剤	1											移植後20日～ノビエ５葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○		○	○	○			○			○			ロール葉	

※　無人航空機散布の詳細は薬剤の登録内容を参照すること。また、「ヘリ」と記載している剤は、「無人ヘリ」で散布登録されているもの。

１）無人航空機での使用時期は、「移植後20日～ノビエ4.5葉期（但し、収穫30日前まで）」