

平成 26 年 9 月 18 日

短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の変更について
(有効成分；アセフェート)

下記のアセフェートを有効成分とする農薬について、別紙の内容の使用制限となる登録の変更申請がされており、農薬の製造者から農薬販売者、使用者等に対して、変更後の使用方法を記載したチラシ等を用いて情報が提供され、変更後の使用方法に基づいて農薬を使用するよう注意喚起が行われております。

つきましては、変更の登録がされる前であっても、農薬製造者からの宣伝や製品に付された票せん等により提供されている変更後の使用方法に基づき農薬を使用するよう農薬使用者を指導するとともに、申請されている変更後の使用方法に基づき、都道府県の防除指針等への反映や生産者団体等が作成する防除暦の変更の指導等に努めるようお願いします。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されております。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第13175号	ホクコーオルトラン水和剤	アセフェート水和剤	北興化学工業株式会社
第19992号	オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第19566号	家庭園芸用ホクコーオルトラン水和剤	アセフェート水和剤	北興化学工業株式会社
第21519号	家庭園芸用オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第21819号	家庭園芸用GFオルトラン水和剤	アセフェート水和剤	住友化学園芸株式会社
第13177号	ホクコーオルトラン粒剤	アセフェート粒剤	北興化学工業株式会社
第19993号	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第19568号	家庭園芸用ホクコーオルトラン粒剤	アセフェート粒剤	北興化学工業株式会社
第21520号	家庭園芸用オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第21789号	家庭園芸用GFオルトラン粒剤	アセフェート粒剤	住友化学園芸株式会社
第21733号	オルトランDX粒剤	アセフェート・クロチアニジン粒剤	住友化学園芸株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1) アセフェート水和剤

（第13175号 ホクコーオルトラン水和剤、第19992号 オルトラン水和剤）

- ①作物名「なす」を削除する。
- ②作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ③作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500倍又は1000～2000倍」を「1500倍又は1500～2000倍」、「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ④作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に変更する。
- ⑤作物名「ブロッコリー」を削除する。

- ⑥作物名「だいこん」を削除する。
- ⑦作物名「はつかだいこん」を削除する。
- ⑧作物名「非結球あぶらな科葉菜類（ケール、からしな、みずな、ルッコラを除く）」を「非結球あぶらな科葉菜類（ケール、からしな、みずな、ルッコラ、たかなを除く）」に変更する。
- ⑨作物名「かぶ」を削除する。
- ⑩作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、「4 回以内」から「2 回以内」及び「5 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内）」から「3 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。
- ⑪作物名「トマト」及び「ミニトマト」を削除する。
- ⑫作物名「とうもろこし」を「未成熟とうもろこし」に変更する。
- ⑬作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 30 日前まで」から「収穫 60 日前まで」、「2 回以内」から「1 回」及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑭作物名「かき」の「適用病害虫名」の「カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、カキノヘタムシガ」の「希釈倍数」を「1000～1500 倍」から「1500 倍」に変更し、「適用病害虫名」の「フジコナカイガラムシ」の「希釈倍数」を「1000 倍」から「1500 倍」に変更し、「適用病害虫名」の「カキノヒメヨコバイ」を削除する。
- ⑮作物名「かんきつ」を削除する。
- ⑯作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採 30 日前まで」から「摘採 45 日前まで」、「2 回以内」から「1 回」及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑰作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫 7 日前まで」から「収穫開始 7 日前まで」に変更する。

2) アセフェート水和剤（家庭園芸用）

（第 19566 号 家庭園芸用 ホクコーオ尔特ラン水和剤、第 21519 号 家庭園芸用 オルトラン水和剤、第 21819 号 家庭園芸用 G F オ尔特ラン水和剤）

- ①作物名「なす」を削除する。
- ②作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、「3 回以内」から「1 回」及び「3 回以内」から「2 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内）」に変更する。
- ③作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500 倍又は 1000～2000 倍」を「1500 倍又は 1500～2000 倍」、「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、「3 回以内」から「1 回」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ④作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更する。
- ⑤作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑥作物名「だいこん」を削除する。
- ⑦作物名「はつかだいこん」を削除する。

- ⑧作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、「4 回以内」から「2 回以内」及び「5 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内）」から「3 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。
- ⑨作物名「トマト」及び「ミニトマト」を削除する。
- ⑩作物名「とうもろこし」を「未成熟とうもろこし」に変更する。
- ⑪作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 30 日前まで」から「収穫 60 日前まで」、「2 回以内」から「1 回」及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑫作物名「かき」の「適用病害虫名」の「カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、カキノヘタムシガ」の「希釈倍数」を「1000～1500 倍」から「1500 倍」に変更し、「適用病害虫名」の「カキノヒメヨコバイ」を削除する。
- ⑬作物名「かんきつ」を削除する。
- ⑭作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫 7 日前まで」から「収穫開始 7 日前まで」に変更する。

3) アセフェート粒剤

(第 13177 号 ホクコーオ尔特ラン粒剤、第 19993 号 オ尔特ラン粒剤)

- ①作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 21 日前まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時植穴散布及び生育期葉面散布」から「植穴処理」及び「3 回以内」から「2 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内）」に変更する。
- ②作物名「トマト」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ③作物名「ミニトマト」を削除する。
- ④作物名「きゅうり、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑤作物名「ピーマン」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「株元散布」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑥作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 21 日前まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「植穴散布及び生育期株元散布」から「植穴処理」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑦作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 14 日前まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1

回」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑧作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。

⑨作物名「はつかだいこん」を削除する。

⑩作物名「かぶ」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更する。

⑪作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

4) アセフェート粒剤（家庭園芸用）

（第19568号 家庭園芸用ホクコーオトルラン粒剤、第21520号 家庭園芸用オトルラン粒剤、第21789号 家庭園芸用GFオトルラン粒剤）

①作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫21日前までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植穴散布及び生育期葉面散布」から「植穴処理」及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。

②作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫21日前までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「植穴散布及び生育期株元散布」から「植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

③作物名「トマト」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「植溝散布又は植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

④作物名「ミニトマト」を削除する。

⑤作物名「きゅうり、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「植溝散布又は植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑥作物名「ピーマン」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「株元散布」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑦作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫14日前までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑧作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前植溝散布」から「植溝散布」及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。

⑨作物名「はつかだいこん」を削除する。

⑩作物名「かぶ」の「使用時期」を「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に変更する。

⑪作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内）」から「3 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。

5) アセフェート・クロチアニジン粒剤（第 21733 号 オルトラン DX 粒剤）

作物名「トマト、なす、きゅうり」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「3 回以内」から「1 回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

1) アセフェート水和剤

（第 13175 号 ホクコ-オ尔特ラン水和剤、第 19992 号 オルトラン水和剤）

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数			
なす	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000 倍	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内			
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000 倍							
キャベツ	ヨウムシ、ハスモンヨトウ タマキシンウバ	1000～1500 倍							
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000～2000 倍							
はくさい	カブラハバチ、ヨウムシ ハスモンヨトウ	1000～1500 倍							
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000～2000 倍							
レタス	ヨウムシ	1000～1500 倍	収穫 14 日前まで				2 回以内	2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)	
ブロッコリー	オオタバコガ	1000 倍							
	ヨウムシ								
だいこん	ヨウムシ、カブラハバチ ダイコンシンクイムシ	1500 倍							
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500～2000 倍							
はつかだいこん	ヨウムシ、カブラハバチ ダイコンシンクイムシ	1500 倍							
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500～2000 倍							
非結球 あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、 みずな、ルッコラを 除く)	アブラムシ類	1500 倍		収穫 21 日前まで	1 回	10a 当り 25L 散布			1 回
かぶ	アブラムシ類、アオムシ、コナガ	1000 倍		収穫 7 日前まで	4 回以内				
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ								
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨウムシ	300 倍							
	アブラムシ類	1000～1500 倍							
	アブラムシ類、シヤガイモガ	1000～1500 倍							
トマト	アブラムシ類	1000～2000 倍	収穫前日まで	3 回以内	散布		3 回以内		
	マメハモグリバエ	1000 倍							
ミニトマト	アブラムシ類	1500 倍	収穫 14 日前まで	1 回				2 回以内 (定植時の処理は 1 回以内、定植後は 1 回以内)	
とうもろこし		1000 倍	収穫 7 日前まで	2 回以内					
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500～2000 倍	収穫 30 日前まで						
	ハマキムシ類	1500 倍							
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシガ	1000～1500 倍	収穫 45 日前まで						
	カキノヒメヨコバイ フジコナカイガラムシ	1000 倍							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数
かんきつ	コカクモンハマキ、シャクトリムシ類 ヤノネカイガラムシ第1世代 ツノロウムシ、ルビローロウムシ ミカンキイロアザミウマ ネキアザミウマ コホウノミドリヒメヨコバイ	1000 倍	収穫 30 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アブラムシ類、ケシキスイ類 コアオハナムグリ、アザミウマ類	1000～1500 倍				
	ミカントゲコナシラミ	1500～2000 倍				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000 倍	摘採 30 日 前まで	2 回以内		2 回以内
	チャノコカクモンハマキ	1000～1500 倍				

〔 変 更 後 〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを 含む農薬の 総使用回数	
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキシンウバ	1000～1500 倍	100～300 L/10a	収穫 30 日 前まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時までの処理 は 1 回以内、定植後 の散布は 1 回以内)	
	アオムシ、コナガ アブラムシ類	1000～2000 倍					1 回	
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500 倍			3 回以内		3 回以内	
	アオムシ、コナガ アブラムシ類	1500～2000 倍					1 回	
レタス	ヨトウムシ	1000～1500 倍		25L/10a	収穫 30 日 前まで		2 回以内	3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)
	オオタバコガ	1000 倍						2 回以内
非結球あぶらな 科葉菜類（ケール、 からしな、みずな、 ルッコラ、 たかなを除く）	アブラムシ類	1500 倍		100～300 L/10a	収穫 21 日 前まで		1 回	1 回
オクラ	アブラムシ類 ミドリヨコバイ	1000 倍		100～300 L/10a	収穫開始 7 日前まで		2 回以内	2 回以内
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ	300 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日 前まで	1 回	1 回		
	アブラムシ類 ジャガイモガ	1000～1500 倍	200～700 L/10a	収穫 45 日 前まで	2 回以内	2 回以内		
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類	1000 倍	200～400 L/10a	摘採 45 日 前まで	1 回	1 回		
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500～2000 倍	200～700 L/10a	収穫 60 日 前まで	1 回	2 回以内	1 回	
	ハマキムシ類	1500 倍					1 回	
かき	カキタテアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシガ フジコナカイガラムシ	1000～2000 倍	200～400 L/10a	摘採 45 日 前まで	1 回	1 回		
茶	チャノミドリヒメヨコバイ	1000～1500 倍	200～400 L/10a	摘採 45 日 前まで	1 回	1 回		
	チャノコカクモンハマキ	1000～1500 倍	200～400 L/10a	摘採 45 日 前まで	1 回	1 回		

２）アセフェート水和剤（家庭園芸用）

（第 19566 号 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤、第 21519 号 家庭園芸用オ
ルトラン水和剤、第 21819 号 家庭園芸用 G F オルトラン水和剤）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数
なす	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000 倍	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000 倍				
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タナキシンウバ	1000～1500 倍	収穫 14 日 前まで			
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000～2000 倍				
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～1500 倍				
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000～2000 倍				
レタス	ヨトウムシ	1000～1500 倍				
	オオタバコガ	1000 倍				
ブロッコリー	ヨトウムシ					
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダイコンシンクイムシ	1500 倍				
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500～2000 倍				
はつかだいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダイコンシンクイムシ	1500 倍				
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500～2000 倍				
ばれいしょ	ヨトウムシ テントウムシダマシ幼虫	1000 倍	収穫 7 日 前まで	4 回以内	散布	5 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内)
	アブラムシ類、シヤガイモガ	1000～1500 倍				
トマト	アブラムシ類	1000～2000 倍	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内
	マメハモグリバエ	1000 倍				
ミニトマト	アブラムシ類	1500 倍	収穫 14 日 前まで	1 回		2 回以内 (定植時の処理は 1 回以内、定植後は 1 回以内)
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000 倍	収穫 7 日 前まで			1 回
とうもろこし	アブラムシ類		2 回以内	収穫 30 日 前まで		2 回以内
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタデヒメヨコバイ	1500～2000 倍				
	ハマキムシ類*	1500 倍				
かき	カキタテアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシガ	1000～1500 倍	収穫 45 日 前まで	3 回以内		3 回以内
	カキノヒメヨコバイ					
かんきつ	コカクモンハマキ、シヤクトリムシ類 ヤノハバチラムシ第 1 世代 ツノロウムシ、ルビローロウムシ ミカンキイロアザミウマ ネギアザミウマ ゴボウノミドリヒメヨコバイ	1000 倍	収穫 30 日 前まで	3 回以内	3 回以内	
	アブラムシ類、ケシキイ類 コアオハナムグリ、アザミウマ類	1000～1500 倍				
	ミカンゲコナジラミ	1500～2000 倍				

*：但し、登録番号 21519 号 家庭園芸用オ尔特ラン水和剤には「ぶどう」の適用病害虫「ハマキムシ類」の登録はありません。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキギンウワバ	1000～1500 倍	100～300 mL/m ²	収穫 30 日 前まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内)
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000～2000 倍					
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500 倍			3 回以内		1 回
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500～2000 倍					
レタス	ヨトウムシ	1000～1500 倍			2 回以内		3 回以内
	オオタバコガ	1000 倍					
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ	1000 倍			1 回		3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)
	アブラムシ類、ジャガイモガ	1000～1500 倍					
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000 倍		収穫開始 7 日前まで	1 回		1 回
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類			収穫 7 日 前まで	2 回以内		2 回以内
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタデヒメヨコバイ	1500～2000 倍	200～700 mL/m ²	収穫 60 日 前まで	1 回	1 回	
	ハマキムシ類*						
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシガ	1500 倍		収穫 45 日 前まで	2 回以内	2 回以内	

*：但し、登録番号 21519 号家庭園芸用カルテシ水和剤には「ぶどう」の適用病害虫「ハマキムシ類」の登録はありません。

3) アセフェート粒剤

(第 13177 号 ホクコーオ尔特ラン粒剤、第 19993 号 オ尔特ラン粒剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫 21 日前まで	3 回以内	定植時植穴散布 及び生育期葉面 散布	3 回以内
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	1 回	散布	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫前日まで	3 回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	2 回以内 (定植時の 処理は 1 回 以内、定植 後は 1 回以 内)
ミニトマト			定植時	1 回	定植時作条散布 又は植穴散布	
きゅうり なす			定植時及び 収穫前日まで	3 回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
ピーマン	アブラムシ類	2g/株				
はくさい	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫 21 日前まで	3 回以内	植穴散布及び 生育期株元散布	3 回以内
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (2g/株)	定植時及び収穫 14 日前まで		株元散布	
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1 回	は種前 作条散布	2 回以内 (は種前及 びは種時の 処理は合計 1 回以内)
はつかだいこん						2 回以内 (は種前の 処理は 1 回 以内)
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 14 日前まで		株元散布	1 回
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	植付時		作条散布	5 回以内 (植付時の 処理は 1 回 以内、植付 後は 4 回以 内)

〔 変 更 後 〕

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを含 む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1 回	植穴処理	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回 以内、定植後の 散布は 1 回 以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		作条散布 又は植穴処理	1 回
きゅうり なす	アブラムシ類 アサミウメ類 オンシツコナジラミ					
ピーマン	アブラムシ類	2g/株			株元散布	
はくさい	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)			植穴処理	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (2g/株)			株元散布	
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		作条散布	
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日 前まで		株元散布	
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	植付時		作条散布	3 回以内 (植付時の処 理は 1 回以 内、植付後は 2 回以内)

４）アセフェート粒剤（家庭園芸用）

（第 19568 号 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剤、第 21520 号 家庭園芸用オ尔特ラン粒剤、第 21789 号 家庭園芸用 G F オ尔特ラン粒剤）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3～6g/㎡ (1 株当たり 1～2g)	定植時及び 収穫 21 日前までの生育期	3 回以内	定植時植穴散布及び生育期 葉面散布	3 回以内	
	アブラムシ類	6g/㎡	育苗期	1 回	散布		
はくさい	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3～6g/㎡ (1 株当たり 1～2g)	定植時及び 収穫 21 日前までの生育期	3 回以内	植穴散布及び生育期株元散布	3 回以内	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ		定植時及び 収穫前日までの生育期		定植時植溝 又は植穴散布、 生育期株元散布		
ミニトマト			定植時	1 回	定植時植溝 又は植穴散布	2 回以内 (定植時の処理は 1 回以内、 定植後は 1 回以内)	
きゅうり なす	アブラムシ類 アサミマ類 オンシツコナジラミ		1 株当たり 2g	定植時及び 収穫前日までの生育期	3 回以内	定植時植溝 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
ピーマン	アブラムシ類						
ブロッコリー	ヨトウムシ	6g/㎡ (1 株当たり 2g)	定植時及び 収穫 14 日前までの生育期		株元散布		
だいこん	アオムシ、コガネアブラムシ類	3～4g/㎡	は種前	1 回	は種前 植溝散布	2 回以内 (は種前及び は種時の処理は合計 1 回以内)	
はつかだいこん						2 回以内 (は種前の処理は 1 回以内)	
かぶ	アブラムシ類	4g/㎡	収穫 14 日前まで			株元散布	1 回
ばれいしょ		3～6g/㎡ (1 株当たり 1～2g)	植付時**			植溝散布	5 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、 植付後は 4 回以内)

**：但し、登録番号 21789 号 家庭園芸用 G F オ尔特ラン粒剤の「ばれいしょ」の使用時期は「植付前」です。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを含む 農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6g/m ² (1 株当たり 1～2g)	定植時	1 回	植穴処理	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回 以内、定植後の 散布は 1 回 以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布	
はくさい	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6g/m ² (1 株当たり 1～2g)	定植時		植穴処理	1 回
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ				植溝散布又は 植穴処理	
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ					
ピーマン	アブラムシ類	1 株当たり 2g			株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6g/m ² (1 株当たり 2g)				
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類	3～4g/m ²			は種前	
かぶ	アブラムシ類	4g/m ²	収穫 21 日前まで		株元散布	
ばれいしょ		3～6g/m ² (1 株当たり 1～2g)	植付時		植溝散布	3 回以内 (植付時の 処理は 1 回以 内、植付後は 2 回以内)

5) アセフェート・クロチアニジン粒剤（第 21733 号 オルトラン DX 粒剤）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	クロチアニジンを 含む農薬の 総使用回数
トマト	アブラムシ類	1g/株	定植時	1 回	植穴処理 土壌混和	3 回以内	4 回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内)
なす		2g/株					
きゅうり	コナジラミ類						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	クロチアニジンを 含む農薬の 総使用回数
トマト	アブラムシ類	1g/株	定植時	1 回	植穴処理 土壌混和	1 回	4 回以内 (育苗期の株 元処理及び定 植時の土壌混 和は合計 1 回 以内、散布及び 定植後の株元 散布は合計 3 回以内)
なす		2g/株					
きゅうり	コナジラミ類						

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は 1 日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されております。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20939号	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	全国農業協同組合連合会
第21904号	スミフェート粒剤	アセフェート粒剤	住友化学株式会社
第20967号	ジェイエース水溶剤	アセフェート水溶剤	全国農業協同組合連合会
第21903号	スミフェート水溶剤	アセフェート水溶剤	住友化学株式会社

■変更内容及び変更理由

1) アセフェート粒剤（第20939号 ジェイエース粒剤、第21904号 スミフェート粒剤）

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ① 作物名「キャベツ」の「適用病害虫名」、「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「ハイマダラノメイガ」を削除し、「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期葉面散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ② 作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ③ 作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫14日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「株元散布」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」に、及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑤ 作物名「かぶ」の「使用時期」及び「使用方法」をそれぞれ「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に、及び「生育期葉面散布」から「株元散布」に変更する。
- ⑥ 作物名「なばな」の「使用方法」を「定植時土壌混和处理」から「土壌混和处理」に変更する。
- ⑦ 作物名「きゅうり、トマト、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫前日まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑧ 作物名「ミニトマト」を削除する。

- ⑨ 作物名「みずな」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に、及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑩ 作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ⑪ 作物名「こまつな」の「使用方法」を「は種前作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。
- ⑫ 作物名「チンゲンサイ」の「使用方法」を「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。

2) アセフェート水溶剤

（第 20967 号 ジェイエース水溶剤、第 21903 号 スミフェート水溶剤）

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ① 作物名「かんきつ」を削除する。
- ② 作物名「かき」の「希釈倍数」を「1000～1500 倍」から「1500 倍」に変更する。
- ③ 作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 30 日前まで」から「収穫 60 日前まで」に、「2回以内」から「1回」に、及び「2回以内」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「3回以内」から「1回」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ⑤ 作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500 倍」から「1500 倍」に、「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「3回以内」から「1回」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑥ 作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更する。
- ⑦ 作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑧ 作物名「だいこん」を削除する。
- ⑨ 作物名「かぶ」を削除する。
- ⑩ 作物名「チンゲンサイ」の「希釈倍数」を「1000 倍」から「1500 倍」に変更する。
- ⑪ 作物名「みずな」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000 倍」から「1500 倍」に、「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に、「2回以内」から「1回」及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑫ 作物名「トマト」、「ミニトマト」及び「なす」を削除する。
- ⑬ 作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫 3 日前まで」から「収穫開始 7 日前まで」に変更する。
- ⑭ 作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総

使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「4 回以内」から「2 回以内」に、及び「5 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内）」から「3 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。

- ⑮ 作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採 30 日前まで」から「摘採 45 日前まで」に、「2 回以内」から「1 回」に、及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第 20939 号 ジェイエース粒剤、第 21904 号 スミフェート粒剤）

【変更前】

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 但し、 収穫 21 日前まで	3 回 以内	定植時植穴処理 及び 生育期葉面散布	3 回以内
	ハイマダラノメイガ		収穫 21 日前まで		生育期葉面散布	
はくさい	アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類		定植時及び生育期 但し、 収穫 21 日前まで		定植時植穴処理 及び 生育期株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (1株当たり 2g)	定植時及び生育期 但し、 収穫 14 日前まで			
だいこん	アオムシ コガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1 回	は種前作条散布	2 回以内 (は種前及び は種時の 処理は 合計 1 回以内)
かぶ		4kg/10a	収穫 14 日前まで		生育期葉面散布	1 回
なばな	アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり 2g)	定植時		定植時土壌混和 処理	
きゅうり	オシツコナジラミ アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3 回 以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
トマト						
ミニトマト	アブラムシ類 オシツコナジラミ		定植時	1 回	定植時作条散布 又は 植穴散布	2 回以内 (定植時の処理 は 1 回以内、 定植後は 1 回以内)
なす	アブラムシ類 オシツコナジラミ アザミウマ類		定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3 回 以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
みずな		6kg/10a	定植時	1回	定植時作条散布 後土壌混和	2回以内 (定植時は 1回以内)
ばれいしょ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時		作条散布	5回以内 (植付時の処理 は1回以内、 植付後は 4回以内)
こまつな			は種前		は種前作条 散布後土壌混和	1回
チンゲンサイ			定植時		定植時作条 散布後土壌混和	

[変更後]

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アセフェートを含 む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1 株当り 1～2g)	定植時	1 回	植穴処理	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 1 回以内)
はくさい						
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (1 株当り 2g)			株元散布	
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		作条散布	
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日 前まで		株元散布	
なばな		6kg/10a (1 株当り 2g)			土壌混和处理	1 回
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 アザミウマ類	3～6kg/10a (1 株当り 1～2g)	定植時		作条散布 又は 植穴処理	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ					
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類					
みずな	アブラムシ類	6kg/10a			作条散布後 土壌混和	
ばれいしょ		3～6kg/10a	植付時		作条散布	3回以内 (植付時の処理は 1 回以内、 植付後は 2 回以内)
こまつな			は種前		作条散布後 土壌混和	1 回
チンゲンサイ			定植時			

2) アセフェート水溶剤

(第 20967 号 ジェイエース水溶剤、第 21903 号 スミフェート水溶剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	アセフェートを含 む農薬の 総使用回数
かんきつ	ヤノネカイラムシ ツノロウムシ ルビエーロウムシ ミカンキイロアザミウマ アザミウマ類	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	コアオハナムケリ チャノキイロアザミウマ アブラムシ類 ケシキスイ類	1000～ 1500 倍					
	ミカントゲコナジラミ	1500 倍					
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシガ	1000～ 1500 倍	200～700 L/10a	収穫 45 日前 まで	2 回 以内		2 回以内
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500～ 2000 倍		収穫 30 日前 まで			
キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 タマナギンウワバ	1000～ 1500 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内		3 回以内
はくさい	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			収穫 14 日前 まで			
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ						
ブロッコリー	オオタバコガ	1000 倍		収穫 14 日前 まで	2 回 以内		2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1500～ 2000 倍					
	ハイマダラノメイガ	1500 倍					
かぶ	アオムシ コナガ アブラムシ類	1500～ 2000 倍		収穫 21 日前 まで	1 回	1 回	
チンゲンサイ	アブラムシ類	1000 倍		収穫 14 日前 まで	2 回 以内	2 回以内 (定植時は 1 回以内)	
みずな							
トマト		1000～ 2000 倍					収穫前日 まで
	マメハモクグリバエ オオタバコガ	1000 倍					

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	アセフェートを含 む農薬の 総使用回数
ミニトマト	アブラムシ類	1000～ 2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時の処理は 1 回以内、定植後 は 1 回以内)
	マメハモグリハエ オオタバコガ	1000 倍					
なす	アブラムシ類	1000～ 2000 倍		収穫 7 日前 まで	3 回 以内		3 回以内
	ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	1000 倍					
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコハ イ			収穫 3 日前 まで	1 回		1 回
ばれいしょ	ヨトウムシ オオニシユウヤホシテントウ						
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍					
			300 倍	25L/10a			
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコハ イ	1000～ 2000 倍	200～400 L/10a	摘採 30 日前 まで	2 回 以内		2 回以内
	チャノコカクモンハマキ	1000～ 1500 倍					

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフトを含む農薬の総使用回数	
かき	カキタマアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシカ	1500 倍	200～700 L/10a	収穫 45 日前 まで	2 回 以内	散布	2 回以内	
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500～ 2000 倍		収穫 60 日前 まで	1 回		1 回	
キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 タマキシンウワバ	1000～ 1500 倍	100～300 L/10a	収穫 30 日前 まで			1 回	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 1 回以内)
はくさい	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1500 倍			3 回 以内		1 回	
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～ 1500 倍 1000 倍					1 回	3 回以内
チンゲンサイ みずな	アブラムシ類	1500 倍			1 回			1 回
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコ バイ	1000 倍		収穫開始 7 日 前まで			2 回 以内	
ばれいしょ	ヨトウムシ オオニジュウヤホシテント ウ				1000～ 2000 倍 300 倍			25L/10a
	アブラムシ類			25L/10a				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバ イ	1000～ 2000 倍		200～400 L/10a	摘採 45 日前 まで		1 回	1 回
	チャノコカクモンハマキ	1000～ 1500 倍						

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は 1 日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されております。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20940号	「興農」ジェネレート粒剤	アセフェート粒剤	興農股份有限公司
第20968号	「興農」ジェネレート水溶剤	アセフェート水溶剤	興農股份有限公司

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第20940号 「興農」ジェネレート粒剤）

- ① 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期（収穫21日前まで）」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期葉面散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ② 作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ③ 作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」に、及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「きゅうり、トマト、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期（収穫前日まで）」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑤ 作物名「ミニトマト」を削除する。
- ⑥ 作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

2) アセフェート水溶剤 (第 20968 号 「興農」 ジェネレート水溶剤)

- ① 作物名「かんきつ」を削除する。
- ② 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「3 回以内」から「1 回」に、及び「3 回以内」から「2 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内)」に変更する。
- ③ 作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000~1500 倍」を「1500 倍」に、「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「3 回以内」から「1 回」に、及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ④ 作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑤ 作物名「だいこん」を削除する。
- ⑥ 作物名「トマト」、「ミニトマト」及び「なす」を削除する。
- ⑦ 作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「4 回以内」から「2 回以内」に、及び「5 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内)」から「3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)」に変更する。
- ⑧ 作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採 30 日前まで」から「摘採 45 日前まで」に、「2 回以内」から「1 回」に、及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第20940号 「興農」ジェネレート粒剤）

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 (収穫 21 日前まで)	3 回以内	定植時植穴処理 及び 生育期葉面散布	3 回以内
はくさい	アオムシ アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり 2g)			定植時植穴処理 及び 生育期株元散布	
	コナガ ヨトウムシ					
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1 回	は種前作条散布	2 回以内 (は種前及び は種時の 処理は 合計 1 回以内)
きゅうり	オンシツコナジラミ アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 (収穫前日まで)	3 回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
トマト	オンシツコナジラミ	6kg/10a (1株当たり 2g)				
	アブラムシ類					
ミニトマト	オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時	1 回	定植時作条散布 又は 植穴散布	2 回以内 (定植時の処理 は 1 回以内、 定植後は 1 回以内)
	なす	6kg/10a (1株当たり 2g)	定植時及び生育期 (収穫前日まで)	3 回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
ばれいしょ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時	1回	作条散布	5回以内 (植付時の処理 は1回以内、植付 後は4回以内)

〔変更後〕

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数	
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1 株当り 1～2g)	定植時	1 回	植穴処理	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 1 回以内)	
はくさい	アオムシ アブラムシ類					6kg/10a (1 株当り 2g)	1 回
	コナガ ヨトウムシ						
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		作条散布		
きゅうり	オンシツコナジラミ アサミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1 株当り 1～2g)	定植時		作条散布 又は 植穴処理	1 回	
トマト	オンシツコナジラミ						
	アブラムシ類	6kg/10a (1 株当り 2g)					
なす	アブラムシ類	6kg/10a (1 株当り 2g)					
ばれいしょ		3～6kg/10a					植付時

2) アセフェート水溶剤 (第 20968 号 「興農」 ジェネレート水溶剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アセフェートを含む農薬の 総使用回数
かんきつ	ヤノ初イラムシ ツノロウムシ ルビノロウムシ コアオナムダリ ミカンキイロアザミウマ	1000 倍	収穫 30 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	チャノキイロアザミウマ アブラムシ類					
キャベツ	アオムシ コナガ	1000～1500 倍	収穫 7 日前 まで	2 回以内		2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)
はくさい						
だいこん	ヨウムシ アブラムシ類	1500 倍	収穫 14 日前 まで			
ブロッコリー	ヨウムシ	1000 倍				
トマト	アブラムシ類	1000～2000 倍	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内
	マメハモグリバエ	1000 倍				
ミニトマト	アブラムシ類	1000～2000 倍	収穫前日 まで	1 回		2 回以内 (定植時の処理 は 1 回以内、定 植後は 1 回以内)
	マメハモグリバエ	1000 倍				
なす	アブラムシ類	1000～2000 倍	収穫 7 日前 まで	3 回以内	3 回以内	
	ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍				
ばれいしょ	アブラムシ類 オオニジュウヤホシテントウ				4 回以内	5 回以内 (植付時の処理 は 1 回以内、植 付後は 4 回以内)
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000 倍	摘採 30 日前 まで	2 回以内	2 回以内	
	チャノコカクモンハマキ	1000～1500 倍				

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	アセフトを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1000～ 1500 倍	100～300 L/10a	収穫 30 日前 まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 1 回以内)
はくさい		1500 倍			1 回		
ばれいしょ	アブラムシ類 オオニジュウヤホシテントウ	1000 倍			2 回 以内		3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～ 2000 倍	200～400 L/10a	摘採 45 日前 まで	1 回		1 回
	チャノコカモンハマキ	1000 ～ 1500 倍					

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は 1 日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。